

FAITES LA COUR AUX OISEAUX

Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec

LE COULICOU À BEC NOIR

Le coulicou à bec noir est un oiseau que je n'ai pas eu la chance de rencontrer souvent. La dernière fois, c'était à Cap-à-l'Aigle, dans Charlevoix. Le chant, une sorte de *cou-cou-cou* sifflé et souvent répété, est vraiment caractéristique. Cet été, le Coulicou à bec noir s'est manifesté vocalement dans les Basses Laurentides. Le *cou-cou-cou* a été réentendu, mais cette fois, presque dans ma cour!

Svelte et élancé

Le Coulicou à bec noir fait partie de la famille des Cuculidés. Il niche au Québec tout comme son cousin, le Coulicou à bec jaune. Ce dernier est beaucoup moins commun et ne se trouve habituellement qu'au sud de la province. Le Coulicou à bec noir possède une longue queue foncée marquée de bandes blanches. Si on l'observe de près, on verra chez l'adulte un cercle oculaire rougeâtre. Les ailes sont longues et permettent à l'oiseau de voler agilement et avec grâce. Le dos est de couleur brun-gris et le bec noir est incurvé vers le bas. Le ventre et la gorge sont blancs et les pieds grisâtres. Il atteint 30 cm et son envergure varie de 41 à 48 cm.

Habitat boisé

Le Coulicou vit dans des bosquets denses tout près de l'eau. Il affectionne les endroits où la végétation arbustive est abondante. Il peut s'observer dans les forêts mixtes et aussi conifériennes. Cet oiseau passe l'hiver en Amérique du Sud où il fréquente les forêts de conifères et ombrophiles. C'est un oiseau aux mœurs discrètes. Comme il se tient en zone bien fournie en végétation, il est difficile à apercevoir. Parfois, il laisse entendre des cris en pleine nuit même si c'est un oiseau diurne.

Nid près du sol

Il se tient souvent seul sauf pendant la période de nidification. Le nid est généralement fixé à une branche d'arbuste, et ce, assez près du sol. Les œufs, au nombre de deux ou trois, sont incubés alternativement par les deux adultes.

Le coulicou, tout comme le coucou, peut pondre ses œufs dans le nid d'autres espèces d'oiseaux. Après 14 jours d'incubation, les petits naissent, mais pas tous en même temps. Ils seront nourris de larves par les adultes pendant leurs premières semaines de vie. C'est à 21 ou 24 jours que les petits prendront leur envol, et ce, pour la première fois.

Un mangeur de chenilles

Au printemps et au début de l'été, j'ai été confronté à une invasion localisée de chenilles près de la maison. Ces larves d'insectes s'attaquaient aux feuilles de nombreuses espèces d'arbres feuillus et d'arbustes ornementaux. J'ai dû traiter certains plants avec un produit écologique pour éviter une défoliation majeure.

Curieusement, le Coulicou à bec noir est un mangeur exclusif de chenilles. Peut-être a-t-il été attiré dans le secteur à cause du garde-manger qui s'y trouvait? Il se nourrit principalement de chenilles à tentes, de spongieuses et d'autres larves de papillons souvent munies de poils et d'épines.

Ces appendices épineux obligent parfois le coulicou à vider son estomac pour éviter qu'il n'en résulte des blocages gastriques.

Reviendra-t-il?

Après la migration automnale et son séjour hivernal en terre plus hospitalière, il sera intéressant de voir si le Coulicou à bec noir sera de retour l'an prochain dans la région. Les voies de la nature ne nous sont pas souvent dévoilées. Tout porte à croire que la forêt buissonnante des alentours saura lui offrir un refuge pour les années à venir...



Jean-Pierre Fabien